

Síntomas compatibles con COVID-19

 <p>Temperatura de 37.5° o más.</p>	 <p>Tos.</p>	 <p>Dolor de garganta.</p>	 <p>Dificultad respiratoria.</p>
 <p>Pérdida de olfato y/o gusto.</p>	 <p>Dolor de cabeza y dolor muscular.</p>	 <p>Mucosidad o congestión nasal.</p>	 <p>Diarrea y/o vómitos.</p>

Frente a todos los casos (sospechoso/confirmado/contacto estrecho) se debe:

<p>Completar el formulario de reporte de casos y realizar lo que el formulario indica, el temperamento a seguir y llamar al 0800-333-3382 (opción 1).</p> 	<p>Esperar el llamado de profundización del caso por parte de Salud.</p> 
---	--

CASO 1

Caso sospechoso (estudiante o docente) que presenta 1 o más síntomas.

<p>Si pertenece a una burbuja</p> <p>Se deberá aislar y testear a la persona de inmediato, aislar preventivamente a los/as que conforman esa burbuja y a quienes hayan tenido contacto estrecho 48 horas antes del inicio de los síntomas, hasta tener el resultado.</p>	<p>Resultado</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Si es negativo, con la constancia del resultado del testeo o la evaluación médica de alta puede restituirse a la escuela y se reactiva la burbuja. 2. Si es positivo, todas las personas relacionadas con la burbuja inicialmente aislada deberán completar el aislamiento estricto durante 10 días desde el último contacto con el caso positivo.
<p>Si no pertenece a una burbuja</p> <p>Se deberá aislar al caso sospechoso y a quienes hayan tenido contacto estrecho de alto riesgo 48 horas antes del inicio de síntomas del caso.</p>	<p>Resultado</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Si es negativo, podrá restituirse a las actividades presenciales con constancia de resultado o certificado de evaluación médica de alta. 2. Si es positivo, deberá aislarse por 10 días desde el inicio de los síntomas.
<p>Si presenta síntomas durante la jornada escolar</p> <p>Estudiante: aislarlo/a en sala de aislamiento y llamar a la familia para que lo retire e indicar evaluación médica inmediata. Se recomienda acercarse a un centro de testeo para dicha evaluación.</p> <p>Personal docente/no docente: se retira de la institución, procede a la evaluación de salud de inmediato y tramita la licencia correspondiente. Se recomienda acercarse a un centro de testeo para dicha evaluación.</p>	<p>Resultado</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Si es negativo, con la constancia del resultado del testeo o la evaluación médica de alta puede restituirse a la escuela y se reactiva la burbuja. 2. Si es positivo, todas las personas relacionadas con la burbuja inicialmente aislada deberán completar el aislamiento estricto durante 10 días desde el último contacto con el caso positivo.


CASO 2

Caso confirmado (estudiante o docente)


<p>Si pertenece a una burbuja</p> <p>Se aísla al caso positivo, a la burbuja y a quienes hayan tenido contacto estrecho 48 horas antes del inicio de síntomas. Si es asintomático, desde el día que se realizó la PCR. Durante 10 días desde el último contacto con el caso positivo de COVID-19.</p>
<p>Si no pertenece a una burbuja</p> <p>se aísla por 10 días y a quienes hayan tenido contacto estrecho 48 horas antes del inicio de síntomas. Si es asintomático/a, desde el día que se realizó la PCR.</p>

CASO 3

Contacto estrecho (CE) (estudiante o docente)

<p>Si pertenece a una burbuja</p> <p>Solo se aísla al contacto estrecho de un caso confirmado por 10 días.</p>																																									
<p>Si no pertenece a una burbuja</p> <p>Se aísla a la persona y deberá cumplimentar con el aislamiento indicado.</p> <p>Únicamente y cuando el caso confirmado forma parte de un grupo familiar y el contacto estrecho no pueda separarse del caso positivo para cumplimentar el aislamiento, se considera como 1.er día de aislamiento del contacto estrecho al último día de aislamiento del último caso confirmado del grupo familiar.</p> <p>Ej.: el padre es un caso positivo, la hija se aísla mientras dura el aislamiento de su padre. Si el padre no puede evitar el contacto con su hija durante 10 días por razones habitacionales o de cuidado, el aislamiento de la hija comienza cuando el padre es dado de alta.</p>  <table border="1"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td> </tr> <tr> <td colspan="10">aislamiento del padre se aíslan padre e hija</td> <td>alta del padre</td> <td colspan="10">aislamiento de la hija se aísla únicamente la hija</td> </tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	aislamiento del padre se aíslan padre e hija										alta del padre	aislamiento de la hija se aísla únicamente la hija									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																						
aislamiento del padre se aíslan padre e hija										alta del padre	aislamiento de la hija se aísla únicamente la hija																														

Testeo



Estudiantes
Con uno o más síntomas deben testearse inmediatamente con turno previo en los centros de testeo específicos (para chicos/as de 6 años en adelante que no tengan factores de riesgo) o en una unidad febril de urgencia (UFU) sin turno (para menores de edad con factores de riesgo y adultos. Los/as menores de 6 años también tienen que asistir a una UFU).

Si tuvieron contacto estrecho con un caso confirmado pero no poseen síntomas compatibles con la COVID-19 y pasaron 7 días desde el último contacto con el caso positivo, pueden asistir a un dispositivo DetectAr sin turno o a un centro de testeo con turno.

Docentes, no docentes y auxiliares
Si presentan uno o más síntomas, pueden testearse en las UFU sin turno previo. Si fueron contacto estrecho, no tienen síntomas asociados a la COVID-19 y ya pasaron 7 días desde el último contacto con el caso positivo, pueden realizarse un test en los dispositivos DetectAr sin turno o en un centro de testeo con turno.

Más información en www.buenosaires.gob.ar/ClasesCuidadas